Website:https://worldsiencepub.com/index.php/Imc Volume:6,Issue 01,October-2026

ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТИЛДОПЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ И ГЕСТАЦИОННОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Рахмонов К.Х.
Махмуджанова Ш.М
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии Ферганский филиал , г.Фергана. Узбекистан.
DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.23111151

Цель исследования оценить эффективность и динамику метилдопы при применение у беременных с хронической и гестационной артериальной гипертензией.

Материалы и методы исследования В исследование были включены беременные 1-,2-,3- триместра , без тяжелых сопуствующих заболеваний и сердечно сосудистых осложнений (хроническая сердечная недостаточность , аритмии сердца,)в количестве 20 пациенов.

Средний возраст пациентов составил 24+/-5 лет средняя длительность у первой группы составило АГ 5,4±2,7 лет , у второй группы 4 мес,±1,2 мес .Всем больным на этапе до лечния и 5 месяцев терапии измеряли офисное АД по методу Коротькова с целью изучения динамику проводили суточное мониторирование АД (СМАД) (Регистратор « CONTEC»). Все пациенты были распределены на 2 группы . Первая группа беременные пациенты с ХАГ (n=14)и вторая группа беременные с гестационной артериальной гипертензией (n=6) на фоне метилдопы .Среднесуточная доза доза метилдопы 1 группе составила 750,0+250,2 мг, во второй группе 500+250,4 мг .

Результаты представлены в виде M±SD

В целом была показана значительная положительная динамика показателей СПАД, независимо от режима терапии. В частности средне-суточная показатель САД (Ср.сут.САД) в 1 группе составил : исходно -140.2±14,2 мм.рт.ст. , в динамике 123,2±10,2 мм.рт.ст..($p<0.001$) Средне-суточная показатель ДАД (Ср.сут.ДАД) составил исходно 85,2±12,4 мм.рт.ст., в динамике 75,2±4.3 мм.рт.ст..($p<0.02$) и во 2 группе средне-суточная показатель САД (Ср.сут.САД) составил : исходно -139.2±10,2 мм.рт.ст. , в динамике 120,2±9,2 мм.рт.ст..($p<0.001$) Средне-суточная показатель ДАД (Ср.сут.ДАД) составил исходно 86,2±11,2 мм.рт.ст., в динамике 73,2±3.3 мм.рт.ст..($p<0.02$). В обеих группах на фоне терапии метилдопой снизились вариабельность АД.Так показатель вариабельности САД в дневное время (Вар.САД дн) в 1 группе составил : исходно -15.2±4,2 мм.рт.ст. , в динамике 12,2±3,2 мм.рт.ст..($p<0.001$)Вариабельность САД в ночное время (Вар.САД н) исходно составило 15,2±,4,2 мм.рт.ст., в динамике 10,7±3.2 мм.рт.ст..($p<0.02$) и во 2 группе Вар.САД дн) в 1 группе составил : исходно -17.2±4,2 мм.рт.ст. , в динамике 11,2±1,2 мм.рт.ст..($p<0.001$)Вариабельность САД в ночное время (Вар.САД н) исходно составило 16,2±,4,2 мм.рт.ст., в динамике 11,7±2.2 мм.рт.ст..($p<0.05$)

Заключение.Показана высокая антигипертензивная эффективность 5 месячной антигипертензивной терапиии у беременных в гуппах с хронической и гестационной гипертензией со значительным положительным влиянием на параметры СПАД .Улучшение СПАД обеспечивало лучшую полпжительную динамику параметров центральной гемодинамки на фоне метилдопы .

© 2026 International Conference on Artificial Intelligence and Applications . All Rights Reserved.